

Folheto informativo: Informação para o utilizador

CROMSOL 2 %, Colírio em solução Cromoglicato de sódio

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a utilizar este medicamento, pois contém informação importante para si.

Utilize este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do seu médico ou farmacêutico.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.
- Se não se sentir melhor ou se piorar, tem de consultar um médico.

O que contém este folheto:

1. O que é CROMSOL e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de utilizar CROMSOL
3. Como utilizar CROMSOL
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar CROMSOL
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é CROMSOL e para que é utilizado

CROMSOL contém cromoglicato de sódio, uma substância ativa com ação antialérgica. CROMSOL é utilizado para o tratamento preventivo de alergias ao nível do olho (mais especificamente conjuntivite ao pólen, conjuntivite primaveril e ceratoconjuntivite marginal) reconhecível pelos olhos e/ou pálpebras inchadas, olhos avermelhados, com comichão ou lacrimejantes.

Deve consultar o seu médico caso não sinta melhoria ou se se sentir menos bem.

2. O que precisa de saber antes de utilizar CROMSOL

Não utilize CROMSOL :

- se tem alergia ao cromoglicato de sódio ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção 6).

Advertências e precauções

- Caso não note melhoria ou se os sintomas persistirem, consulte o seu médico.
- Caso utilize lentes de contacto moles, não pode utilizar CROMSOL, já que este contém um agente conservante (benzalcónio).

Outros medicamentos e CROMSOL

No caso de tratamento concomitante por outro colírio em solução, aguarde **15 minutos** entre aplicações.

Caso tome ou tenha tomado recentemente outro medicamento, incluindo um medicamento obtido sem receita médica, contacte o seu médico ou o seu farmacêutico.

Gravidez e amamentação e fertilidade

Não utilize CROMSOL senão por recomendação do seu médico. Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Pode sentir uma perturbação visual passageira depois da utilização de CROMSOL.

Recomenda-se que aguarde o desaparecimento dos sintomas antes de conduzir um veículo ou utilizar uma máquina.

3. Como utilizar CROMSOL

Utilize este medicamento exatamente como indicado pelo seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

A dose usual num adulto e em crianças é de 1 ou 2 gotas de colírio em cada olho, 4 vezes por dia. Caso não ocorra melhoria ou se os sintomas persistirem, consulte o seu médico.

Este medicamento está destinado a ser aplicado no olho (via ocular).

1. Lave cuidadosamente as mãos antes de proceder à aplicação.
2. Evite o contacto da ponta do frasco com o olho ou as pálpebras.
3. Aplique uma gota em cada olho enquanto olha para cima e puxando ligeiramente a pálpebra inferior para baixo.
4. Volte a fechar o frasco depois da utilização.

CROMSOL deve ser utilizado de forma contínua enquanto esteja exposto à causa da sua alergia, de outra forma os sintomas podem reaparecer.

Se utilizar mais CROMSOL do que deveria

Consulte o seu médico ou farmacêutico.

Durante a utilização de quantidades demasiado elevadas de cromoglicato de sódio, não foi assinalado qualquer efeito tóxico.

Caso se tenha esquecido de utilizar CROMSOL

Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar. Basta continuar o seu tratamento.

Se parar de utilizar CROMSOL

Durante a paragem é possível que os sintomas reapareçam caso seja exposto aos fatores responsáveis à alergia do olho.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, peça informações ao seu médico ou ao seu farmacêutico.

4. Efeitos secundários possíveis

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários, embora estes não se manifestem em todas as pessoas.

Os efeitos seguintes podem ocorrer ao nível do olho

- reações alérgicas aos componentes do colírio;
- sensação temporária de formigamento ou ardência;
- perturbação visual passageira depois da aplicação do colírio.

Comunicação de efeitos secundários

Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá comunicar efeitos secundários diretamente através do sistema nacional de notificação.

5. Como conservar CROMSOL

Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Não utilize CROMSOL após o prazo de validade impresso no embalagem exterior.
Armazenar a uma temperatura não superior a 30 °C, na embalagem exterior, ao abrigo da luz.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Qual a composição de CROMSOL

- A substância ativa é o cromoglicato de sódio numa concentração de 20 mg/ml.
- Os outros componentes são o cloreto de sódio, o edetato dissódico, o cloreto de benzalcónio, o polissorbato 80 e água para preparações injetáveis.

Qual o aspeto de CROMSOL e conteúdo da embalagem

CROMSOL é um colírio em solução apresentado num frasco contendo 5 ml de solução clara.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante

CROMSOL é uma marca registrada

Propriedade da Exphar

Zona Industrial de Nivelles Sul, Zona II - Avenida Thomas Edison 105-1402 Thines (Bélgica)

Fabricante

Ahlcon Parenterals (I) SP-917-918, Phase-III, Ind. Area, Bhiwadi-301019, Dist. Alwar (Rajastão), ÍNDIA



Com a ponta: apertar a fundo a tampa sobre o nariz do frasco.



Perfure o nariz do frasco com a ponta



Administre as gotas com uma pressão ligeira do frasco. Volte a colocar a tampa depois de cada utilização.

Este folheto foi revisto pela última vez em 01/2019